

AWARD[®]

Acaricida

Tu insecticida de confianza para
una gestión integrada en cítricos:

- Alta eficacia frente a todos los estadios de la araña
- Doble acción sinérgica
- Efecto de choque y persistencia



Rápida acción sobre adultos
y prolongada eficacia sobre huevos,
larvas y ninfas de araña.



Acaricida para el control de ácaros tetranychidos en frutales de pepita, solanáceas, vid y cítricos.



EFICAZ

Alta eficacia frente a todas las arañas.



PERSISTENTE

Gracias a su doble modo de acción, ofrece una máxima persistencia.



IDEAL

Rompe resistencias debido a la acción de sus dos materias activas.


CARACTERÍSTICAS

- **AWARD®** presenta doble acción sinérgica: combinación de Hexitiazox (grupo IRAC 10A) y Fenpiroximato (grupo IRAC 21) para un control integral de todas las fases del ciclo biológico de los ácaros; huevos, larvas, y adultos.
- **AWARD®** presenta un elevado efecto de choque y persistencia: rápida acción sobre adultos y prolongada eficacia sobre huevos, larvas y ninfas.
- **AWARD®** es un acaricida ideal para el manejo de resistencias dado que combina la acción de sus dos materias activas.

MODO DE ACCIÓN ÚNICO

AWARD® tiene dos modos de acción: uno en el metabolismo de la energía (*Fenpiroximato*) y otro como regulador de crecimiento (*Hexitiazox*). Clasificación IRAC, 21A/10A.

AWARD® actúa inhibiendo el transporte de electrones en el complejo mitocondrial, teniendo acción sobre larvas, ninfas y adultos (*Fenpiroximato*); y como regulador del crecimiento inhibiendo la síntesis de quitina, actuando como ovicida, larvicida y ninficida (*Hexitiazox*).



AWARD® ES EFICAZ FRENTE A LAS PRINCIPALES ARAÑAS


AWARD® actúa eficazmente sobre todo el ciclo evolutivo de los ácaros tetranychidos (*Tetranychus sp.*, *Eutetranychus sp.* y *Panonychus sp.*), es decir, sobre huevos, larvas, ninfas y adultos.

RESULTADOS DE LA EXPERIMENTACIÓN CON AWARD®

En el gráfico se muestra la eficacia de **AWARD®** a dosis de 75 mL/hL frente a formas móviles de *Tetranychus urticae*. En **Mandarino variedad Clemenules**.




Se observa una buena eficacia de **AWARD®** con una mayor persistencia que el estándar.




En el gráfico se muestra la eficacia de **AWARD®** a dosis de 75 mL/hL en el control de *Eutetranychus banksi*. En **Limonero variedad Verna**.



Se observa una muy buena eficacia y persistencia de **AWARD®**.



En el gráfico se muestra el número de formas móviles/hoja de *Panonychus ulmi* después de un mes de aplicar AWARD® a 1,2 L/ha. En **Manzano variedad Golden**.



Se observa el excelente control de AWARD® con cero formas móviles/hoja a los 33 DDA.



CLASIFICACIÓN FRENTE A ARTRÓPODOS BENEFICIOSOS

Los artrópodos beneficiosos contribuyen a mantener las poblaciones de las plagas en niveles en los que no causen un impacto económico grande, de ahí la importancia del uso de productos fitosanitarios que respeten al máximo a este tipo de insectos beneficiosos. AWARD® presenta un riesgo aceptable con una recuperación de los artrópodos beneficiosos de 42 días después de la aplicación. AWARD® podrá ser utilizado en programas de Producción Integrada (IPM).

CLASIFICACIÓN IOBC FRENTE A FAUNA AUXILIAR

● Hexitiazox ● Fenpiroximate

(Clasificación promedio estimada para las materias activas indicadas basada en el impacto promedio frente a artrópodos beneficiosos)

Clase	Categoría de toxicidad IOBC
Clase 1	Inofensivo
Clase 2	Ligeramente dañino
Clase 3	Moderadamente dañino
Clase 4	Dañino

RECOMENDACIONES DE USO

AWARD® deberá ser aplicado en pulverización foliar mojando bien tanto el haz como el envés de las hojas cuando se alcancen entre 1 a 3 formas móviles/hoja.

Se puede utilizar en distintos cultivos, con un número máximo de aplicaciones, dosis, volúmenes de caldo máximos y plazos de seguridad, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Cultivo	Plaga/Enfermedad	N° aplic.	Volumen de caldo (L/ha)	Dosis máxima (L/ha)	P.S. (días)
Naranja y limonero	Ácaros tetránquidos, <i>Tetranychidae</i> , Ácaro rojo de los cítricos, <i>Panonychus citri</i>	1	2000-2500	1,2	14
Manzano y peral	Ácaro rojo de los frutales, <i>Panonychus ulmi</i>	1	1200-1700	1,2	28
Vid y uva de mesa	Ácaros tetránquidos, <i>Tetranychidae</i> , Araña roja común, <i>Tetranychus spp</i>	1	800-1200	1,2	28
Tomate y berenjena	Araña roja común, <i>Tetranychus spp</i>	1	500-1000	1,2	7

CUÁNDO APLICAR AWARD

En nuestro país se estima que entre el 15% y el 20% de los daños que producen las plagas en los cultivos están causados por ácaros. **AWARD®** actúa eficazmente sobre todo el ciclo evolutivo de los ácaros tetraníquidos (*Tetranychus sp.*, *Eutetranychus sp.* y *Panonychus sp.*), es decir, sobre huevos, larvas, ninfas y adultos.

LÍMITE MÁXIMO DE RESIDUOS (LMR)

AWARD® se encuentra registrado en distintos países dentro de la Unión Europea y fuera de la misma. En los países de la Unión Europea, los Límites Máximos de Residuos para Fenpiroximato y Hexitiazox ya están fijados y armonizados para los cultivos donde la sustancia activa está registrada, por lo que los cultivos tratados pueden ser exportados sin limitaciones.

En la siguiente tabla se indican los LMR's (ppm) para Fenpiroximato y Hexitiazox para Europa y Estados Unidos.



LMR (ppm)		Europa		Estados Unidos	
		Fenpiroximato	Hexitiazox	Fenpiroximato	Hexitiazox
CÍTRICOS	NARANJO	0,50	1,00	1,00	0,60
	LIMONERO	0,50	1,00	1,00	0,60
FRUTALES	MANZANO	0,30	1,00	0,30	0,40
HORTÍCOLAS	TOMATE	0,30	0,50	0,20	0,50
	BERENJENA	0,30	0,50	0,20	1,50
VIÑA	UVA DE MESA	0,30	1,00	-	1,00
	VINIFICACIÓN	0,30	1,00	-	1,00

(*) Países de la UE, Suiza, Noruega

AWARD®

Acaricida con doble modo de acción que proporciona un excelente control sobre ácaros tetraníquidos. Puede emplearse en programas de Producción Integrada (IPM).