



KENJA[®]

Fungicida

La decisión más sabia frente a Botritis:

- Alta eficacia frente a Botritis
- Una sola materia activa
- 1 día de plazo de seguridad



Posicionamiento
aplicar de manera preventiva

Número de registro
ES-00483

certisbelchim.es



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

EXCELENTE PARA EL CONTROL DE BOTRITIS EN CULTIVOS HORTÍCOLAS DE INVERNADERO COMO PIMIENTO, PEPINO, TOMATE, CALABACÍN Y BERENJENA.



EFICAZ

Actúa en todas las etapas de crecimiento del ciclo de botritis



SELECTIVO

No afecta al desarrollo del cultivo



INNOVADOR

Nueva materia activa con estructura molecular flexible


ISOSETAMID

Nueva sustancia activa perteneciente al nuevo grupo químico fenil-oxo-etil tiofeno amida.


- Fungicida de amplio espectro incluido dentro del grupo 7 SDHI (inhibidores de la succinato deshidrogenasa).
- Actúa sobre el Complejo II de la cadena respiratoria del patógeno causando la detección de la producción de energía.
- Garantía de control en todas las etapas del desarrollo del patógeno.

Estructura molecular flexible


La estructura molecular de los SDHI se caracteriza por un enlace específico que, en base a la actividad de la molécula, puede ser rígido o flexible.



SDHI con enlace flexible




SDHI con enlace rígido




A diferencia de la mayoría de los SDHI que tienen un enlace rígido, la Isofetamid tiene un enlace flexible, lo que le proporciona unas propiedades únicas con capacidad para adaptarse a los cambios del patógeno, reduciendo así el riesgo de que estos cambios o mutaciones deriven en resistencia a las aplicaciones de isofetamida.

Efecto translaminar



Desde el haz hacia el envés



Desde el envés hacia el haz


Gracias a esta propiedad, **Kenja®**

- Mejora la protección
- Mejora la resistencia al lavado


Kenja® garantiza una protección rápida y completa de la hoja gracias a su movimiento translaminar

Resultados en hortalizas de invernadero

KENJA®: Eficacia (%) en fruto frente a botritis en tomate de invernadero



KENJA®: Eficacia (%) en fruto frente a botritis en pimiento de invernadero



**Kenja® registrado en cultivos de invernadero
(Tomate, Pimiento, Berenjena, Pepino, Calabacín y Calabaza)**

La decisión más sabia frente a Botritis

- Nuevo grupo químico
- Estructura molecular flexible
- Excelente actividad translaminar
- Alto nivel de eficacia
- Seguro para la fauna auxiliar
- Plazo de seguridad: 1 día


KENJA®

Características

Composición:..... 40% p/v (400 g/l) de isofetamid
Formulación:..... SC
Clasificación FRAC..... 7
Agente:..... Botritis y Esclerotinia

Dosis:..... 1 a 1,2 l/ha
Plazo de seguridad:..... 1 día
Nº de aplicaciones: 2
Intervalo:..... 7 a 10 días

Recomendaciones de uso



Cultivos registrados en invernadero:

Cultivo	Agente	Dosis(l/ha)	Nº de Aplicaciones	Intervalo (días)	Volumen de agua(l/ha)	Plazo de seguridad
Tomate	Podredumbre blanca, Podredumbre gris, Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum	1 - 1,2	2	7-10	400 - 1200	1 día
Pimiento						
Berenjena						
Pepino						
Calabacín						
Calabaza						

El registro incluye: Pepinillo, Okra y Quimbombo