



Insecticida

## Protección eficaz, exclusiva y compatible en cítricos

- Alta eficacia y protección de nuevos brotes: pulgón, trips y scirtothrips
- Altamente compatible con fauna auxiliar
- Mecanismo de acción único y exclusivo (grupo 29)



Solución eficaz y respetuosa  
con el medio ambiente  
y el aplicador.

## CÍTRICOS SIN PULGÓN NI SCIRTOHrips



**Respetuoso**  
con los auxiliares



**Respetuoso**  
con el operario



**Respetuoso**  
con el medio ambiente

## CARACTERÍSTICAS

- Teppeki® es un insecticida sistémico formulado con Flonicamida 50%.
- Teppeki® es único en su mecanismo de actuación frente a las plagas (Grupo IRAC 29).
- Teppeki® es muy respetuoso con la fauna auxiliar.
- Teppeki® se puede utilizar desde el inicio del cultivo frente a pulgones y trips (Scirtothrips y otros).


## INSECTICIDA ÚNICO, EFICAZ Y RESPETUOSO CON LOS AUXILIARES

Teppeki® actúa mediante la inhibición alimentaria, actuando a las pocas horas y consiguiendo un interesante efecto remanente y de choque.



### Flonicamid: una molécula única



Teppeki® es un aficida sistémico (50% de Flonicamid), que pertenece a la familia de las Piridinocarboxamidas.




### Flonicamid: un modo de acción único

Actúa como inhibidor de la alimentación, único representante del grupo 29 (clasificación IRAC). Actúa por contacto e ingestión. Tiene sistema ascendente y efecto translaminar.

Teppeki® presenta un elevado efecto sistémico y translaminar que permite proteger nuevas brotaciones y alcanzar aquellas plagas más escondidas en la vegetación.




## Teppeki® es altamente eficaz frente a un amplio rango de especies de pulgones diferentes




Flonicamid provoca una rápida interrupción de la alimentación de los pulgones, que se traduce en la falta de producción de melaza.

Teppeki® presenta una elevada eficacia de control frente a pulgones al tiempo que resulta respetuoso frente a los insectos auxiliares.



Eficacia y efectos secundarios de las aplicaciones foliares de Teppeki® para el manejo de pulgones en cítricos. Centro IFAPA "Las Torres-Tomejil" (Alcalá del Río, Sevilla)

## Teppeki® Resultados de eficacia contra *Scirtothrips spp.*




Eficacia selectiva: Teppeki® es altamente efectivo contra áfidos, pero presenta un bajo impacto en insectos beneficiosos, como polinizadores y depredadores naturales, lo que lo hace compatible con estrategias de manejo integrado de plagas (IPM)

## ¿CUÁNDO APlicar TEPPEKI®?

Realizar la primera aplicación de primavera contra pulgones cuando se vea un riesgo elevado de infestación (preferiblemente antes de caída de pétalos, cuando se desarrollan los primeros brotes y cuando se detecten los primeros adultos). Aplicar contra *Scirtothrips spp.* desde brotación al detectarse las primeras formas móviles.

**Dosis de uso:** 5 g/hL con un mínimo de 1200 g/ha. Recomendación de 150 gr/ha.

Utilizar siempre el producto dentro de un programa de tratamiento, al fin de mantener la alternancia de materias activas, realizando así una adecuada gestión del riesgo de aparición de resistencias.



## USOS REGISTRADOS

Teppeki® está registrado en los siguientes cultivos: cítricos, arroz, hortícolas (tomate, calabacín, calabaza, melón, sandía y pepino), frutales (peral, melocotón, nectarina, cerezo y ciruelo), algodonero, ornamentales herbáceas y ornamentales leñosas.

### Teppeki® ❤ auxiliares

*Adalia bipunctata*  
*Amblyseius andersoni*  
*Amblyseius degenerans*  
*Amblyseius swirskii*  
*Anagyrus pseudococcii*  
*Anthocoris nemoralis*  
*Aphidius colemani*  
*Aphidoletes aphidimyza*

*Aphytis spp.*  
*Apis mellifera*  
*Atheta coriaria*  
*Bombus terrestris*  
*Chrysoperla carnea*  
*Coccinella septempunctata*  
*Cryptolaemus montrouzieri*  
*Encarsia formosa*

*Episyrrhus balteatus*  
*Euseius stipulatus*  
*Hypoaspis miles*  
*Hypoaspis aculeifer*  
*Kampidromus aberrans*  
*Macrolophus caliginosus*  
*Neoseiulus californicus*  
*Neoseiulus cucumeris*

*Nesidiocoris tenuis*  
*Orius laevigatus*  
*Phytoseiulus persimilis*  
*Transeius montdorensis*  
*Typhlodromus pyri*