NUEVO

MILDICUT® MAX

Protección total contra el mildiu de la vid

- Acción sistémica y contacto
- Potente protección del racimo
- Efecto translaminar y esporicida



Posicionamiento:
El intervalo entre aplicaciones será de 8-10 días con dosis: 3,5 l/ha y de 12-14 días con dosis: 4,5 l/ha. Aplicar desde BBCH 15 hasta la maduración de los frutos BBCH 81-89.

Nº Registro: ES-01685

certisbelchim.es

Certis Belchim
GROWING TOGETHER

MILDICUT® MAX

FUNGICIDA CONTRA MILDIU DE LA VID

- ACCIÓN SISTÉMICA Y CONTACTO
- EFECTO TRANSLAMINAR
- PROTECCIÓN DEL RACIMO
- CONTROL DE ESPORAS
- RESISTENCIA AL LAVADO

CARACTERÍSTICAS

Mildicut® Max está formulado a base de CIAZOFAMIDA 25 g/l + FOSFONATO DISÓDICO 250 g/l [SC] P/V.
Mildicut® Max está registrado para mildiu de la viña (*Plasmopara viticola*).
Mildicut® Max tiene acción sistémica y por contacto.
Mildicut® Max tiene acción preventiva y curativa hasta 36 horas después de la infección.
Mildicut® Max tiene gran persistencia, protegiendo a la vid hasta 14 días desde su aplicación.
Mildicut® Max tiene gran resistencia al lavado.

ACTIVIDAD SISTÉMICA



Mildicut® Max tiene un modo de acción sistémico real debido a la incorporación de Difosfonato de Sodio en su formulación, protegiendo los órganos en crecimiento de la vid.

CIAZOFAMIDA

25 g/L

- Modo de acción específico: grupo de inhibidores de la quinona.
- Acción esporicida.
- Gran resistencia a la lluvia.
- Contacto y preventivo: inhibición de la germinación.

FOSFONATO DISÓDICO

250 g/L

- Facilita la penetración en el tejido.
- Efecto translaminar y antiesporulante.
- Acción sistémica.
- Activación de las defensas de la planta.

MODOS DE ACCIÓN

La ciazofamida bloquea el transporte de electrones a nivel mitocondrial.





Mitocondria

Célula del hongo

Fungicida QiI: Inhibidores de quinona dentro de los inhibidores (clasificación FRAC)

La ciazofamida es una de las pocas materias activas del mercado que actúa sobre el sitio QiI bloqueando la producción de energía del patógeno.

DOBLE ACCIÓN SOBRE CONTROL DE ESPORAS

Mildicut® Max impide la supervivencia de las esporas, asegurando una elevada protección de hojas y racimos, gracias a su efecto esporicida y antiesporulante.

ACTIVACIÓN DE LAS DEFENSAS NATURALES

Activación específica de genes en toda la planta



Planta sin identificar
(puede ser cualquier cultivo)

Esas proteínas aumentarán la resistencia del cultivo frente a futuras agresiones (biótico o abiótico)

MILDICUT® MAX

POSICIONAMIENTO TÉCNICO

HOJAS DESPLEGADAS ◄ MILDICUT® MAX ► MADURACIÓN

PERFIL DE PRODUCTO

Composición: CIAZOFAMIDA 25 g/l + FOSFONATO DISÓDICO 250 g/l [SC] P/V
Formulación: SC
Dosis: 3,5–4,5 l/ha
Usos autorizados: Vid y uva de mesa
Plazo de seguridad: 21 días

Un intervalo de pulverización de 8 a 14 días (en función de la presión) que permite al viticultor una flexibilidad total en la gestión de sus operaciones de pulverización en función de las prioridades cambiantes del viñedo.

Cultivo	Objetivo	Dosis	N° de aplicaciones	Días de intérvalo de tratamiento	Periodo de aplicación (BBCH)*	Plazo de seguridad
Vid y uva de mesa	Mildiu	3,5-4,5l/ha	2	8-14 días*	15-89	21 días

*El intervalo entre aplicaciones será de 8–10 días con dosis: 3,5 l/ha y de 12–14 días, con dosis: 4,5 l/ha.
Aplicar desde BBCH 15 hasta la maduración de los frutos BBCH 81–89.

Certis Belchim
GROWING TOGETHER

Certis Belchim
Sucursal en España | C/ Severo Ochoa, 18 - 2° |
Parque Empresarial de Elche | 03203 Elche, Alicante, España
Tel. +34 966 65 10 77 | info.es@certisbelchim.com | www.certisbelchim.es