

NOMADA

Fungicida



Protege el cultivo preventivamente, pero también puede impedir el desarrollo de la enfermedad y detener la infección durante el período de incubación (acción curativa).

La sustancia activa, difenoconazol, tiene una rápida penetración dentro de la planta de forma translaminar, presentando una sistemia local.

Su amplio campo de actividad hace que sea adecuado para el control de enfermedades producidas por complejos fúngicos

Usos autorizados

CULTIVOS	ENFERME-DADES	DOSIS	P.S. (días)	Recomendaciones
APIO	Septoria	0,3-0,5 l/ha	14	Repetir tratamiento cada 14 días, máximo 4 veces.
CLAVEL	Roya	0,3-0,5 l/ha	NP	Repetir tratamiento cada 7-14 días, máximo 4 veces.
MANZANO	Moteado	0,01-0,015%	14	Repetir tratamiento cada 10-14 días, máximo 4 veces. Aplicar desde los primeros síntomas hasta la recolección respetando el plazo de seguridad.
NÍSPERO	Moteado	0,01-0,015%	14	Repetir tratamiento cada 10-14 días.
PATATA	Alternaria	0,5 l/ha	14	Repetir tratamiento cada 7-14 días, máximo 4 veces. En caso de ataque de mildiu, mezclar con RANMAN TOP.
PERAL	Moteado / Roya / Septoria	0,01-0,015%	14	Repetir tratamiento cada 10-14 días, máximo 4 veces.
REMOLACHA AZUCARERA	Cercospora / Oidio	0,3-0,5 l/ha	30	Repetir tratamiento cada 21-28 días, máximo 3 veces.
TOMATE	Alternaria	0,5 l/ha	7	Repetir tratamiento cada 7-14 días, máximo 4 veces. En caso de ataque de mildiu, mezclar con RANMAN TOP.