

Soleto[®]

Herbicida

La base de su programa de herbicidas

- Nuevo registro en algodón
- Gran persistencia en suelo desnudo
- Amplio espectro de acción sobre malas hierbas

**MULTI
FLEX**
herbicide

Aplicar en pre-emergencia del cultivo (BBCH 00-08) a una dosis de 2-2,5 l/ha en función de las condiciones del suelo.

Nº registro: ES-00525

certisbelchim.es



Certis Belchim
GROWING TOGETHER



Doble acción

Efecto pre-post emergencia
de las malas hierbas



Muy soluble

Fácil incorporación
al suelo



Gran persistencia

Hasta 45 días
después del tratamiento



2 modos de absorción
= más flexibilidad

Pre-emergencia
de las malas hierbas.

Post-emergencia
de las malas hierbas.

Soleto®



Soleto®




Solubilidad


Cuanto más soluble es un ingrediente activo, menos agua necesita para quedar disponible.




Solubilidad alta
= más flexibilidad



Modo de acción



Recomendaciones de uso



Aplicar Soleto durante los 4 días siguientes a la siembra. Adaptar la dosis de Soleto en función de la composición del suelo.

	Arcilla < 15%	15% < Arcilla < 25%	Arcilla > 25%	
Algodón	No recomendado*	Sin restricción	Sin restricción	Utilización de Soleto respetando las recomendaciones de uso.
				Utilización posible respetando la dosis máxima indicada.

*No utilizar en suelos arenosos

Dicotiledóneas

Abutilon theophrasti
Amaranthus retroflexus
Ambrosia artemisiifolia
Atriplex patula
Capsella bursa-pastoris
Chenopodium album
Chenopodium hybridum
Datura stramonium
Galinsoga parviflora
Hibiscus trionum
Mercurialis annua
Polygonum aviculare
Polygonum convolvulus
Polygonum persicaria
Portulaca oleracea
Senecio vulgaris

Dicotiledóneas

Solanum nigrum
Stachys arvensis
Stachys arvensis
Stellaria media
Veronica persica
Xanthium strumarium

Gramíneas

Digitaria sanguinalis
Echinochloa crus-galli
Panicum dichotum
Poa annua
Setaria species

■ Muy sensible ■ Sensible ■ Moderadamente sensible ■ No sensible



*Espectro indicativo; puede variar en función del tipo de suelo, de las condiciones climáticas antes y después de la aplicación, del estadio de las malas hierbas en el momento de la aplicación.

Usos y dosis autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Vol. Caldo	Condic. Específico
Algodonero	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	2-2,5 L/ha	1	200-300 L/ha	Uso menor por jerarquía de cultivos. Tratamiento herbicida en pre-emergencia mediante pulverización mecánica. BBCH 00-08.
Espárrago	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	2,5 L/ha	1	200-300 L/ha	Uso menor por jerarquía de cultivos. Tratamiento herbicida en pre-emergencia mediante pulverización mecánica. Tras la retirada de la cosecha.
Girasol	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	2-3 L/ha	1	300-400 L/ha	Tratamiento herbicida en pre-emergencia mediante pulverización mecánica.
Haba para grano	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	2 L/ha	1	300-400 L/ha	Habas para producción de semillas. Tratamiento herbicida en pre-emergencia mediante pulverización mecánica.
Soja	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	2-3 L/ha	1	300-400 L/ha	Tratamiento herbicida en pre-emergencia mediante pulverización mecánica.
Tabaco	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	2-2,5 L/ha	1	200-300 L/ha	Uso menor por jerarquía de cultivos. Tratamiento herbicida en pre-emergencia mediante pulverización mecánica. No autorizado para consumo humano. Tratamiento en pre-plantación

**MULTI
FLEX**
herbicide

- Nueva materia activa en algodón
- Herramienta para el manejo de resistencias
- Control de malas hierbas de hoja ancha y estrecha
- Aplicado sobre suelo desnudo favorece un arranque limpio del cultivo

Características

- Ingrediente activo: Metobromuron
- Concentración: 50%
- Grupo químico: Ureas
- Formulación: SC
- Código HRAC: 5 (C2)
- Época de aplicación: Pre-emergencia
- Dosis en algodón: 2 - 2,5 L/ha

