

Soleto[®]

La base de sus programas herbicidas

**MULTI
FLEX**
herbicide



La base de sus programas herbicidas

Modo de acción

Soleto®

Absorción

por las raíces o el follaje (suelo y eficacia de contacto)



Translocación

absorción principalmente por el sistema radicular y translocación **vía xilema** a las hojas (sistémico)




Efecto herbicida

el activo está vinculado a un sitio específico en los cloroplastos
inhibición de la fotosíntesis



Respuesta de la planta

clorosis y necrosis del tejido foliar y los síntomas de lesiones aparecen después de la emergencia y del comienzo de la fotosíntesis




Pre-emergencia de las malas hierbas.

Post-emergencia de las malas hierbas.



**2 modos de absorción
= Más flexibilidad**




Solubilidad

Cuanto más soluble es un ingrediente activo, menos agua necesita para estar disponible.



**Solubilidad alta
= Más flexibilidad**



Fuente: Agritox



**Amplio espectro
= Más flexibilidad**


Control de malas hierbas (*)

Dicotiledóneas 3 L/ha	
<i>Abutilon theophrasti</i>	
<i>Amaranthus retroflexus</i>	
<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	
<i>Atriplex patula</i>	
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	
<i>Chenopodium album</i>	
<i>Chenopodium hybridum</i>	
<i>Datura stramonium</i>	
<i>Galinsoga parviflora</i>	
<i>Hibiscus trionum</i>	
<i>Mercurialis annua</i>	
<i>Polygonum aviculare</i>	
<i>Polygonum convolvulus</i>	
<i>Polygonum persicaria</i>	
<i>Portulaca oleracea</i>	
<i>Senecio vulgaris</i>	

Dicotiledóneas 3 L/ha	
<i>Solanum nigrum</i>	
<i>Stachys arvensis</i>	
<i>Stachys arvensis</i>	
<i>Stellaria media</i>	
<i>Veronica persica</i>	
<i>Xanthium strumarium</i>	

Gramíneas 3 L/ha	
<i>Digitaria sanguinalis</i>	
<i>Echinochloa crus-galli</i>	
<i>Panicum dichotum</i>	
<i>Poa annua</i>	
<i>Setaria species</i>	

■ muy sensible ■ moderadamente sensible ■ sensible ■ no sensible



Testigo

Un amplio espectro de acción



* espectro indicativo; puede variar en función del tipo de suelo, de las condiciones climáticas antes y después de la aplicación, del estadio de las malas hierbas al momento de la aplicación.

Recomendaciones de uso

Pre-emergencia

Variedades clásicas

Soleto

Soleto se aplicará solo o en asociación con otro producto de pre-emergencia

Variedades tolerantes

Soleto

Soleto se aplicará en pre-emergencia a una dosis reducida, seguido de un producto de post-emergencia

Post-emergencia

Producto de post-emergencia



Aplicar Soleto durante los 4 días siguientes a la siembra
Adaptar la dosis de Soleto en función de la composición del suelo

	Arcilla < 15%	15% < Arcilla < 25%	Arcilla > 25%
Girasol	2 L/ha max	Sin restricción	Sin restricción

- Utilización de Soleto respetando las recomendaciones de uso.
- Utilización posible respetando la dosis máxima indicada.

Soleto®



- Nuevo modo de acción
- Herramienta para el manejo de resistencias
- Control de malas hierbas de hoja ancha y estrecha
- Base de los programas herbicidas

Características

- Ingrediente activo: Metobromuron
- Concentración: 50%
- Grupo químico: urea
- Formulación: SC
- Código HRAC: C2
- Época de aplicación: Pre-emergencia
- Usos: Girasol, Soja, Habas (producción de semillas)
- Dosis: 2 - 3 l/ha

