

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

BOTANIGARD[®] 22 WP

NÚMERO DE REGISTRO

23.276

COMPOSICIÓN Y FORMULACIÓN

Suspensión de conidias de *Beauveria bassiana* GHA (N° CAS: 63428-82-0)

Concentración: 22% - 4,4x10E10 Conidias/G)

Tipo de preparado: Polvo mojable (WP).

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

BOTANIGARD[®] 22 WP, presenta una novedosa formulación a base de esporas vivas del hongo *Beauveria bassiana* cepa GHA, un hongo entomopatógeno capaz de parasitar numerosas especies de insectos, trips, mosca blanca, larvas de lepidópteros, coleópteros y pulgones. Este insecticida biológico actúa por contacto e infección.

BOTANIGARD[®] 22 WP está registrado para el control de distintos tipos de mosca blanca, y contiene un mínimo de 44 mil millones de esporas por gramo de producto, lo que lo convierte en el mayor concentrado de esporas de *Beauveria bassiana* que hay en el mercado en la actualidad.

PRESENTACIÓN

Botella de plástico de alta densidad (HPDE) de 500 gramos.

MODO DE ACCIÓN

BOTANIGARD® 22 WP es un insecticida no sistémico que actúa por contacto, mediante acción mecánica destruyendo la cutícula de los insectos, provocando su deshidratación y absorbiendo los nutrientes del interior de sus células.

Pueden infectar al insecto, no sólo a través del intestino, sino que también por los espiráculos y aberturas naturales, especialmente en forma directa por penetración del integumento, lo que le permite infestar a los huéspedes independientemente de sus hábitos alimenticios.

B. bassiana produce metabolitos secundarios que generalmente son complejos de bajo peso molecular que poseen actividad antibacteriana, antifúngica, citotóxica e insecticida.

Las conidias de *B. bassiana* ejercen la acción insecticida a través de un proceso que consta de 3 etapas fundamentales: adhesión, germinación – penetración y crecimiento – colonización (producción de metabolitos).

USOS AUTORIZADOS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	VOL. CALDO
Tomate	Mosca blanca, pulgones, araña roja y trips	62,5 - 125 g/hL	500 -1500 L/ha
Cucurbitáceas			
Pimiento			
Berenjena			
Fresal			600 -1200 L/ha
Lechuga	Pulgón	62,5 - 115 g/hL	500 L/ha
Algodonero	Mosca blanca	62,5 - 125 g/hL	400 – 500 L/ha

Máximo 4 aplicaciones cada 5 -7 días.

Plazo de seguridad: No procede.

Condicionamientos específicos: Tomate, pimiento, berenjena, cucurbitáceas y fresa (aplicación en invernadero). Lechuga y algodón (aplicación al aire libre).

MODO DE EMPLEO

1. Pulverizar al final del día, humedad alta (> 60-70%).
2. Temperatura al menos de 12°C (mejor > 15°C).
3. Tenga en cuenta las diferencias en los cultivos, hoja, etc.
4. Al menos 4 aplicaciones.
5. Pulverizar intervalo de 5-7 días.

Puede aplicarse junto a nutrientes foliares siempre que se mantenga el pH entre 2-13.

Controles de la exposición del medio ambiente: En virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de su envase al medio ambiente.

No deberá almacenarse ni utilizarse a temperaturas superiores a 25°C.

El producto es estable a las condiciones normales de manejo y almacenamiento.

Buenas prácticas de manejo:

El producto debe ser aplicado mediante pulverización normal.

Los formulados pueden ser aplicados solos o en mezcla-tanque con fijadores, jabones, insecticidas, aceites emulsores e insecticidas, pero no con fungicidas.

Su aplicación debe realizarse como mínimo 48 horas después de un tratamiento fungicida.

Para la correcta germinación de las conidias se requieren condiciones de alta humedad, de esta forma, la infección se consigue en 24-48 horas. No se debe emplear en medios acuáticos.

LÍMITE MÁXIMO DE RESIDUOS (LMRs)

No procede fijar un plazo de seguridad, ya que *Beauveria bassiana* cepa GHA no tiene fijado LMR.

MANEJO DE RESISTENCIAS

Debido a la estrecha relación plaga - hongo, la probabilidad de desarrollo de resistencias es baja. Esto permite incluir a BOTANIGARD® 22 WP en programas de manejo de resistencias junto a productos con otras materias activas.

PREPARACIÓN DEL CALDO

El producto debe ser aplicado mediante pulverización normal.

Para un control óptimo de la plaga, se recomienda utilizar un volumen de agua que asegure el total cubrimiento de la superficie vegetal.

Los formulados pueden ser aplicados solos o en mezcla-tanque con fijadores, jabones, insecticidas, aceites emulsores e insecticidas, pero no con fungicidas.

ADVERTENCIAS

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

El producto no es peligroso de conformidad con la normativa aplicable al transporte.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

No existen valores límites ambientales para las sustancias que constituyen el producto.

Mitigación de riesgos en la manipulación:

SEGURIDAD DEL APLICADOR

Aire libre e invernadero:

Mezcla, carga, aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo:

- Guantes de protección química.
- Ropa de protección de al menos tipo 6-B contra agentes biológicos, según norma UNE EN 14126:2004.
- Mascarilla autofiltrante para partículas al menos de tipo FFP2, según norma UNE-EN149:2001+A1:2010 o bien mascarilla con filtro del tipo P2, según normas UNE-EN 143:2001, UNE-EN 143/AC:2002, UNE-EN 143:2001/AC:2005, UNE-EN 143:2001/A1:2006.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

Aire libre e invernadero:

- Guantes de protección química.
- Ropa de protección de al menos tipo 6-B contra agentes biológicos, según norma UNE EN 14126:2004.
- Mascarilla autofiltrante para partículas al menos de tipo FFP2, según norma UNE-EN149:2001+A1:2010 o bien mascarilla con filtro del tipo P2, según normas UNE-EN 143:2001, UNE-EN 143/AC:2002, UNE-EN 143:2001/AC:2005, UNE-EN 143:2001/A1:2006.

FRASES ASOCIADAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO

- Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.
- Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá prescindir del equipo de protección, siempre que se mantengan las ventanas cerradas. Los operadores llevarán guantes de protección química cuando tengan que salir del tractor para realizar tareas de mantenimiento o limpieza que puedan surgir durante la aplicación.
- Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo.
- No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.
- No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química.
- Asimismo, no se deberá aplicar este producto en ninguna zona adyacente a zonas residenciales.
- Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales en lugares no destinados al público en general (Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios).
- Productos no autorizados en ámbitos distintos de la producción primaria agraria definidos en el artículo 46 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre.

NORMAS GENERALES PARA UN USO RESPONSABLE

Precauciones para una manipulación segura:

Leer la etiqueta antes del uso.

Se recomienda transferir el producto a una velocidad lenta para evitar la generación de cargas electrostáticas.

Evite el contacto con ojos, piel, nariz y boca.

Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

Los envases abiertos deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantenerse verticales para evitar fugas.

Medidas de higiene:

Lavarse las manos inmediatamente después de cada manipulación del producto y de manera sistemática antes de abandonar el lugar de trabajo.

Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO

PELIGRO



Frases de riesgo:

H 315 Provoca irritación cutánea.

H 400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Consejos de prudencia:

P 261 Evitar respirar la niebla de pulverización.

P 262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa .

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P284 (En caso de ventilación insuficiente) llevar equipo de protección respiratoria.

P302+P352 En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.

P304+P340 En caso de inhalación, transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

Condiciones de almacenaje:

Temperatura mínima: 5 °C. Temperatura máxima: 30 °C. Tiempo máximo recomendado: 12 meses. Guardar en un lugar fresco y seco.

CERTIS recomienda mantener el producto en frío para asegurar la máxima estabilidad de las conidias que lo conforman y la vida útil del producto.

Otras indicaciones reglamentarias:

“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGAS LAS INSTRUCCIONES DE USO” (EUH 401).

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo del producto cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Contiene *Beauveria bassiana* cepa GHA. Es sensibilizante por vía cutánea e inhalatoria.

Contiene caolín, el contenido de sílice cristalina en la fracción respirable debe ser inferior al 0,1%.

El formulado no debe contener la microtoxina beauvericina por encima de 5 mg/kg.

La mezcla derivada del petróleo con nº CAS 64742-55-8 debe tener un contenido en hidrocarburos aromáticos policíclicos, medidos de acuerdo con IP 346 (extracto DMSO) menor de 3%.

Mitigación de riesgos ambientales:

- Para el uso al aire libre:

SPe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

SPe8: Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos y las malas hierbas. No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo.

- Para el uso en invernadero:

En uso en invernadero, retírense o cúbranse las colmenas durante el tratamiento y duración 16 horas después del mismo.